

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 18-3-86032292

(R)

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 72

du 3 Mars 1986

- : - Le bulletin d'abonnement 1986 aux Avertissements Agricoles est joint à cet envoi. Il ne concerne pas ceux qui sont déjà abonnés par leur coopérative.
- : - Si les traitements sur **pêcher** ont été effectués avant les fortes pluies du 21 et 22/02, il faut les renouveler.
- : - Pensez à la fumagine, tavelure et cochenille noire des **oliviers**
- : - Halte aux vers gris et aux mouches dans les **cultures maraichères**

OLIVIER

*** Fumagine - Tavelure

Dès la récolte terminée ou après la taille et avant le départ en végétation, effectuez un traitement contre ces champignons avec un produit à base de cuivre (250 grs de cuivre métal/hl).

Traiter par temps calme, bien faire ruisseler la bouillie sur la végétation.

*** Cochenille noire

Pour détruire les larves hivernantes, en preservant un maximum d'insectes auxiliaires, préférez

SEVIN L 85 150g/ hl

P32

CULTURES MARAICHÈRES

***** Vers gris**

Effectuez des traitements préventifs sur les parcelles infestées l'année dernière et les cultures sensibles avec :

- une application de micro-granulés avant plantation.

carbaryl	SEVIN Appat	30 kg/ha
chloryriphos	DURSBAN Appat	50 kg/ha
phoxime	VOLATON 5	75 kg/ha

- une application par pulvérisation foliaire

acéphate	ORTHENE 50	1,8 kg/ha
deltamethrine	DECIS	0,3 l/ha
cypermethrine	KAFIL	0,3 l/ha
	SHERPA 10	0,3 l/ha
	CYMBUSH	0,3 l/ha
	RIPCORD 5	0,6 l/ha
bacillus thuringiensis	BACTOSPEINE	0,6 l/ha
	PM 16000	

***** Mouches des cultures légumières**

En plein champ, en traitement de sol, préférez les granulés ou microgranulés - leur durée d'action est plus longue. Ils doivent être incorporés sur 15 -20 cm, soit par épandage de micro-granulés soit par pulvérisation abondante (2000 l à 3000 l/ha).

Il est aussi possible d'effectuer une pulvérisation sur les mouches adultes, sur cultures, lors des périodes de vol, dès la fin de la rémanence de l'insecticide du sol.

Dans ce cas, la dose de produit à utiliser est différente

:	:	
:	Alternier les produits afin d'éviter les phénomènes	:
:	de résistance	:
:	:	:

Vous pouvez employer :

<u>MATIERE ACTIVE</u>	<u>DOSE DE MATIERE ACTIVE</u>	<u>PRODUIT COMMERCIAL</u>
bromophos ethyl	- 5400 g/ha sur chou carotte, oignon	NEXAGAN
carbofuran	- 1000 g/ha sur chou et carottes en localisation - 750 g/ha sur oignon en localisation - 400 g/ha sur haricot en localisation	CURATER
chlorfenvinphos	- 5000 g/ha sur oignon et carotte - 6000 g/ha sur chou - 4000 g/ha sur haricot	BIRLANE
diazinon	- 8000 g/ha sur oignon et carotte - 1000 g/ha sur haricot	BASUDINE UMUTER
diethion	- 6000 g/ha sur oignon carotte, actif sur chou et navet	RHODOCIDE
fonofos	- 2000 g sur oignon carotte en localisation actif sur radis	DYFONATE

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1986 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.